

- метотрексат 24 мг/сут внутрь 1 раз в неделю
- 6 - меркаптопурин 60 мг/сут внутрь

	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс
6-меркаптопурин	1	1	1	2	1	1	1

150%

- метотрексат 36 мг/сут внутрь 1 раз в неделю

- 6 - меркаптопурин 90 мг/сут внутрь

	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс
6-меркаптопурин	2	2	2	2	2	2	1/2

50%

- метотрексат 12 мг/сут внутрь 1 раз в неделю

- 6 - меркаптопурин 30 мг/сут внутрь

	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс
6-меркаптопурин	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1

Уровень лейкоцитов	<1000	1000 – 2000	2000 - 3000	>3000
Доза метотрексата	0%	50%	100%	150%
Доза 6-меркаптурина	0%	50%	100%	150%

Критерии отмены (приостановки поддерживающей терапии)

- снижение уровня лейкоцитов менее $1 \cdot 10^9/\text{л}$
- присоединение инфекции
- Признаки печеночной токсичности III степени:
- повышение уровня АЛТ/АСТ более 5 возрастных норм
- повышение уровня общего билирубина более 3 возрастных норм
- длительная диарея

Дополнительно проводится четыре курса реиндукции этопозидом при условии хорошего состояния ребенка, при уровне лейкоцитов не менее $2 \cdot 10^9/\text{л}$, гранулоцитов не менее $0,5 \cdot 10^9/\text{л}$ и тромбоцитов не менее $100 \cdot 10^9/\text{л}$. Первый курс реиндукции назначается через 6 недель поддерживающей терапии. Интервалы между началом одного курса и началом следующего 8 недель. В течение курса реиндукции поддерживающая терапия 6-меркаптопурином и метотрексатом не прерывается.

- Этопозид 50 мг/м² внутрь ежедневно в одно время в течение 10 дней.

Анализы:

- ОАК 1 раз в неделю (на кануне приема метотрексата)
- Биохимический анализ крови: АЛТ/АСТ; общий билирубин; мочеви́на, креатинин 1 раз в неделю

7. УЗИ органов брюшной полости, органов малого таза 1 раз в 2 недели в первый год наблюдения, далее 1 раз в 3 мес.

8. Пункция костного мозга по окончании всей поддерживающей терапии (цитологическое исследование и определение МОБ-статуса).

9. ЭКГ, ЭХО-КГ, гормоны щитовидной железы 1 раз в 3 месяца в первый год наблюдения, по показаниям чаще.

10. Мед. отвод от прививок первые 12 месяцев с момента окончания лучевой терапии, последующие 6 месяцев вакцинация инактивированными вакцинами, далее после 1 года вакцинация живыми вакцинами.

11. Коррекция терапии и референс обследований через запрос по закрытым каналам связи: обратиться в НИИ ДОиГ ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» через Федеральную телемедицинскую информационную систему ФГБК «ВЦМК «Защита» Минздрава России.

12. Пациенту показано проведение реабилитации в условиях ФДРЦ "Кораблик" (Московская обл., г. Подольск, ул. Высотная, д.4А).

Лечащий врач: _____
Заведующий отделением: _____
Зам.гл.врача по мед.части НИИ _____
ДОиГ: _____

Лазарева Карина Рамилевна
Синягина Юлия Владимировна
Горбунова Татьяна
Викторовна